

**BORATO sódico 3%, LIDOCAÍNA 1% y MIEL rosada 20% en  
cocimiento de LLANTÉN Colutorio<sup>4,18</sup>**

**INFORMACIÓN PARA EL PALIATIVISTA. ¿CÓMO SE PRESCRIBE?**

Borato Sódico	3%
Lidocaína	1%
Miel Rosada	20%
Cocimiento de llantén, csp	200 ml

**Indicaciones:** Estomatitis aftosa. Glosodinia. Otras irritaciones de la mucosa oral.

**INFORMACIÓN PARA EL FARMACÉUTICO ELABORADOR.  
MODUS OPERANDI PROPUESTO**

TABLA DE CONTENIDOS				
MATERIA PRIMA (Principios activos y excipientes)	CANTIDAD (%, peso, Vol, unidades)	CANTIDAD REAL PESADA	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS (Información relevante)	PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
<b>Borato Sódico</b>	3%	<b>6 g</b>	Soluble 1 parte en 20 de agua, mejor en caliente. Soluble en glicerina e insoluble en alcohol.	Antiséptico, antiinflamatorio, astringente.
<b>Lidocaína ClH</b>	1%	<b>2 g</b>	Soluble en agua y alcohol.	Anestésico local.
<b>Miel Rosada</b>	20%	<b>40 ml</b>	Se prepara a partir de extracto fluido de rosas rojas, alcohol 90°, agua destilada, glicerina y miel.	Astringente, demulcente y suavizante.
<b>Cocimiento de Llantén</b>	csp 200 ml	<b>csp 200 ml</b>	(Para 100 ml): Se prepara al 5% calentando a ebullición durante 10 m. en vaso de precipitados 20 g de las hojas de <i>Plantago major</i> en 100 ml de agua. Filtrar por gasa.	Gran actividad demulcente por su alta riqueza en mucílagos.
<b>TOTAL:</b>	<b>100 %</b>	<b>200 ml</b>		

MODUS OPERANDI	
<b>PASO 1</b>	Pesar todos los componentes teniendo en cuenta su riqueza.
<b>PASO 2</b>	Preparar el cocimiento de llantén.
<b>PASO 2</b>	Verter el cocimiento de llantén previamente filtrado por gasa en un vaso de precipitados.
<b>PASO 2</b>	Añadir el borato sódico, la lidocaína y la miel rosada sin dejar de agitar con una varilla.
<b>PASO 3</b>	Llevar a agitador magnético hasta completa homogeneización.
<b>PASO 5</b>	Envasar en frasco topacio.

<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	Ausencia de precipitados. La suspensión debe ser homogénea.
---------------------------	---

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

**Administración:** Bucofaríngea (colutorio). Agitar antes de usar. No ingerir.

**Conservación:** Conservar en envase topacio, en lugar fresco y seco, protegido de la luz. En verano es recomendable conservar en nevera.

**Caducidad:** 30 días.