

CAPSAICINA 0,05% y KETAMINA % Gel transdérmico^{2,5,12,15,21}**INFORMACIÓN PARA EL PALIATIVISTA. ¿CÓMO SE PRESCRIBE?**

Capsaicina	0,05 %
Ketamina	2%
Gel de absorción transdérmica, csp	100 g

Indicaciones: Dolor neuropático.

**INFORMACIÓN PARA EL FARMACÉUTICO ELABORADOR.
MODUS OPERANDI PROPUESTO**

TABLA DE CONTENIDOS				
MATERIA PRIMA (Principios activos y excipientes)	CANTIDAD (%, peso, Vol, unidades)	CANTIDAD REAL PESADA	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS (Información relevante)	PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Capsaicina	0,05%	0,05 g	Polvo blanco, no soluble en agua y soluble en alcohol. Muy irritante. Precaución en su manejo.	Anestésico local.
Ketamina HCl	2%	2 g	Soluble en agua y en alcohol.	Anestésico.
Etanol 95%	cs	5 ml		Facilita la incorporación de los activos en el vehículo.
Gel PLO	csp 100 ml	csp 100 ml	Gel formado por poloxamer, lecitina (22 ml), palmitato de isopropilo, etoxidiglicol y agua.	
TOTAL:	100 %	100 ml		

MODUS OPERANDI	
PASO 1	Pesar todos los componentes teniendo en cuenta su riqueza.
PASO 2	Pulverizar y mezclar la capsaicina y la ketamina en mortero.
PASO 3	Añadir poco a poco el alcohol hasta formar una pasta.
PASO 4	Añadir la solución de lecitina y mezclar bien.
PASO 5	A continuación, añadir la cantidad de gel PLO suficiente para 100ml y homogeneizar.
PASO 6	Envasar en frasco dosificador.

CONTROL DE CALIDAD	Ausencia de partículas. Ausencia de burbujas. Test de extensibilidad.
---------------------------	---

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Administración: Tópica. Aplicar el medicamento con un ligero masaje y lavar bien las manos al finalizar.

Conservación: Envase hermético con dosificador. Proteger de la luz.

Caducidad: 3 meses.

PRECAUCIÓN: *Muy irritante para ojos y mucosas.*