

**DILTIAZEM 2% Pomada rectal**<sup>5,12,32</sup>**INFORMACIÓN PARA EL PALIATIVISTA. ¿CÓMO SE PRESCRIBE?**

Diltiazem HCl	2%
Vaselina filante, csp	100 g
<b><u>Indicaciones:</u></b> Fisura Anal.	

**INFORMACIÓN PARA EL FARMACÉUTICO ELABORADOR.  
MODUS OPERANDI PROPUESTO**

TABLA DE CONTENIDOS				
MATERIA PRIMA (Principios activos y excipientes)	CANTIDAD (%, peso, Vol, unidades)	CANTIDAD REAL PESADA	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS (Información relevante)	PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
<b>Diltiazem HCl</b>	2%	<b>2 g</b>	Polvo blanco, fácilmente soluble en agua y poco en alcohol.	Vasodilatador. Relaja el esfínter anal mejorando los espasmos y dolor asociado.
<b>Vaselina líquida</b>	cs	<b>5 g</b>	Líquido transparente y oleoso.	Propiedades emolientes. Facilita la absorción de los activos vehiculizados en vaselina filante.
<b>Vaselina filante</b>	csp 100 g	<b>csp 100 g</b>	Masa untuosa blanda. Aspecto de ungüento.	No es absorbida por la piel. No se presta a la absorción de los medicamentos.
<b>TOTAL:</b>	<b>100 %</b>	<b>100 g</b>		

MODUS OPERANDI	
<b>PASO 1</b>	Pesar todos los componentes teniendo en cuenta su riqueza.
<b>PASO 2</b>	Pulverizar el diltiazem en mortero.
<b>PASO 3</b>	Añadir poco a poco la vaselina líquida y agitar con pistilo hasta formar una pasta.
<b>PASO 4</b>	Añadir la vaselina filante y seguir agitando.
<b>PASO 5</b>	Es recomendable el uso de un sistema de agitación mecánica para asegurar una buena homogeneización.
<b>PASO 6</b>	Envasar en tubo de aluminio con cánula rectal.

<b>CONTROL DE CALIDAD</b>	La pomada debe ser blanca, brillante y homogénea. Ausencia de partículas sólidas visibles. Test de extensibilidad.
---------------------------	--

**INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE**

<b>Administración:</b> Rectal.
<b>Conservación:</b> Envase en tubo de aluminio y cánula. Bien cerrado en un lugar fresco y seco.
<b>Caducidad:</b> 3 meses.