

LAMOTRIGINA 10 mg/ml Suspensión^{2,40}**INFORMACIÓN PARA EL PALIATIVISTA. ¿CÓMO SE PRESCRIBE?**

Lamotrigina	10 mg/ml
Jarabe, csp	100 ml
Indicaciones: Epilepsia. Trastorno bipolar.	

**INFORMACIÓN PARA EL FARMACÉUTICO ELABORADOR.
MODUS OPERANDI PROPUESTO**

TABLA DE CONTENIDOS				
MATERIA PRIMA (Principios activos y excipientes)	CANTIDAD (%, peso, Vol, unidades)	CANTIDAD REAL PESADA	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS (Información relevante)	PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Lamotrigina	10 mg/ml	1 g	Se recomienda partir de comprimidos bucodispersables.	Antiepiléptico.
Metilcelulosa 1000	5 mg/ml	0,5 mg		Estabilizante.
Agua purificada	50 ml	50 ml		Vehículo.
Jarabe simple	csp 100 ml	csp 100 ml	Mezcla de agua y sacarosa.	Usar vehículo sin azúcar en diabéticos.
TOTAL:	100 %	100 ml		

MODUS OPERANDI	
PASO 1	Tomar los comprimidos bucodispersables necesarios y triturarlos bien en un mortero. Añadir la metilcelulosa 1000.
PASO 2	Añadir el agua purificada y casi la totalidad del jarabe simple y agitar vigorosamente hasta obtener una dispersión homogénea.
PASO 3	Enrasar en la probeta con el jarabe simple restante hasta el volumen total.
PASO 4	Acondicionar.

CONTROL DE CALIDAD	Después de agitar suavemente, la suspensión debe tener un aspecto homogéneo y ausencia de precipitados al menos durante dos minutos.
--------------------	--

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Administración: Oral. Agitar antes de usar. Se recomienda envase con dosificador.
Conservación: Entre 4° y 25°. Proteger de la luz.
Caducidad: 30 días.
<u>PRECAUCIÓN EN EL PACIENTE DIABÉTICO</u>