

NISTATINA 100.000 UI/ml y LIDOCAÍNA 2% Colutorio^{20,41,57}**INFORMACIÓN PARA EL PALIATIVISTA. ¿CÓMO SE PRESCRIBE?**

Nistatina	100.000 UI/ml
Lidocaína	2%
Suspensión acuosa, csp	100 ml

Indicaciones: Antifúngico y anestésico en mucositis orofaríngea.

**INFORMACIÓN PARA EL FARMACÉUTICO ELABORADOR.
MODUS OPERANDI PROPUESTO**

TABLA DE CONTENIDOS				
MATERIA PRIMA (Principios activos y excipientes)	CANTIDAD (%, peso, Vol, unidades)	CANTIDAD REAL PESADA	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS (Información relevante)	PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Nistatina	100.000 UI/ml	Según riqueza	Insoluble en agua.	Antifúngico.
Lidocaína	2%	2 g	Soluble en agua.	Anestésico local.
Sorbitol líquido	5%	5 ml	Soluble en agua.	Endulzante, estabilizante.
Agua destilada	csp 100 ml	csp 100 ml		Vehículo.
<i>TOTAL:</i>	<i>100 %</i>	<i>100 ml</i>		

MODUS OPERANDI	
PASO 1	Pesar los componentes teniendo en cuenta la riqueza.
PASO 2	Incorporar la nistatina y la lidocaína.
PASO 3	Añadir el sorbitol, sin dejar de agitar.
PASO 4	Añadir el agua destilada, sin dejar de agitar.
PASO 5	Homogeneizar.

CONTROL DE CALIDAD	La suspensión debe ser homogénea.
---------------------------	-----------------------------------

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Administración: Bucofaríngea (Colutorio). Agitar antes de usar.

Conservación: Refrigerado y protegido de la luz.

Caducidad: 14 días.