

NITROGLICERINA 0,2% y LIDOCAÍNA 1,5% Pomada rectal^{4,12}**INFORMACIÓN PARA EL PALIATIVISTA. ¿CÓMO SE PRESCRIBE?**

Nitroglicerina	0,2%
Lidocaína	1,5%
Vaselina, csp	60 g
<i>Indicaciones:</i> Fisura Anal.	

**INFORMACIÓN PARA EL FARMACÉUTICO ELABORADOR.
MODUS OPERANDI PROPUESTO**

TABLA DE CONTENIDOS				
MATERIA PRIMA (Principios activos y excipientes)	CANTIDAD (%, peso, Vol, unidades)	CANTIDAD REAL PESADA	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS (Información relevante)	PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
Nitroglicerina	0,2%	Según riqueza	Insoluble en agua.	Nitrato orgánico.
Lidocaína	1,5%	0,9 g	Soluble en agua.	Anestésico local.
Vaselina	csp 60 g	csp 60 g		Vehículo.
TOTAL:	100 %	60 g		

MODUS OPERANDI	
PASO 1	Pesar el polvo de la nitroglicerina teniendo en cuenta la riqueza.
PASO 2	Mezclar la nitroglicerina con la lidocaína.
PASO 3	Añadir un poco de vaselina líquida para hacer una pasta en el mortero.
PASO 4	Añadir el resto de vaselina filante.
PASO 5	Homogeneizar con medio mecánico fuerte.
CONTROL DE CALIDAD	Pomada homogénea, sin agregados.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Administración: Rectal.
Conservación: Envase bien cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad: 3 meses.